



Eruzione cutanea

Minotti Marina

AOU Policlinico Umberto I - Roma



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO




ERUZIONE CUTANEA

L'eruzione cutanea o rash cutaneo è un cambiamento del colore e dell'aspetto della cute associato ad un'irritazione o un rigonfiamento della pelle



Principali cause



Come si presenta un'eruzione cutanea



PAPULA

Piccolo rilievo solido della pelle, quindi palpabile



MACULA

Lesione piatta rispetto al piano cutaneo e discromica



PLACCA

Lesione solida superficiale talora derivante dalla confluenza di più papule





PONFO

Rilievo solido,
evanescente e
migrante, lesione
elementare tipica
dell'orticaria



FORUNCOLO

Causato in genere
dall'infezione
di un follicolo



PETECCHIA

Macchia piatta
rotondeggiante causata
da una microemorragia
a livello di cute o
mucose



VESCICOLA

Rilievo non solido,
non transitorio
dovuto a cavità
ripiena di liquido
sieroso o ematico
di dimensioni
inferiori a 1cm



PUSTOLA

Rilievo eritematoso
contente pus



BOLLA

Rilievo non solido, non
transitorio dovuto a
cavità ripiena di
liquido sieroso o
ematico di dimensioni
superiori a 1cm



Metodologia Triage

Valutazione Immediata

Valutare lo stato generale, stato di coscienza (AVPU), rigidità nucale, morfologia delle lesioni (in particolare se si tratta di rash petecchiale), colorito cutaneo.

N.B. il bambino va fatto spogliare per un'adeguata visualizzazione del rash

Valutazione Soggettiva



Raccolta mirata

Da quanto è in corso l'esantema?

Ha cambiato aspetto da quando ha fatto la sua comparsa?


Causa prurito? Se sì, è intenso e insopportabile oppure è lieve e intermittente ?

Il bambino ha mai presentato febbre da quando è comparsa l'eruzione cutanea?

Il bambino sta seguendo qualche terapia farmacologica? Se sì, quale?

Il bambino ha subito di recente la puntura o il morso di qualche insetto?

Il bambino soffre di qualche particolare allergia?





Valutazione Oggettiva

Rilevazione parametri vitali e breve esame fisico mirato

FC

FR

SpO2

TC

Dolore

L'esame fisico mira a confermare la presenza di lesioni cutanee

dare una prima sommaria descrizione dell'esantema

eventuali manifestazioni associate (stato settico, distress respiratorio)



CASI CLINICI



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Caso clinico 1

Valutazione Immediata
Condizioni generali buone

Valutazione Soggettiva

Bambina di 5 anni con rash cutaneo insorto improvvisamente, associato ad intenso prurito.

La madre riferisce che la bambina ha mangiato un gelato gusto pistacchio e fragola.


Valutazione Oggettiva

Parametri rilevati:

- FC 107 bpm
- FR 28 a/m
- SpO2 100%
- TC 36 °C
- Dolore 3 secondo Scala Wong Baker

Esame obiettivo:

Ponfi pruriginosi su volto, arti superiori e tronco



TRIAGE PEDIATRICO DELL'ERUZIONE CUTANEA

| CODICE TRIAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametri Vitali | da codice 1 | da codice 2 | da codice 3 | da codice 4 | da codice 5 |
| Caratteristiche del sintomo/segno principale | Rash petecchiale o purpurico con febbre alta e stato settico. Orticaria + altri sintomi compatibili con anafilassi. Edema della lingua e distress respiratorio | Orticaria in pz con pregressa reazione. Punture di imenotteri (vespe, api, calabroni) in pz con pregressa reazione. | Eruzione cutanea + febbre > 5 giorni. Reazione orticarioide ad insorgenza acuta dopo esposizione ad allergene, senza sintomi associati Rash purpurico agli arti inferiori. | Eruzione cutanea, sospetta malattia infettiva. Rash orticarioide pruriginoso. | Eruzione cutanea senza prurito. Punture d'insetto non associate ad altri sintomi. Lesioni dermatiti che senza altri sintomi. Riferita orticaria. |
| Sintomi/segni associati | Rigidità nucale | Distress respiratorio, sintomi gastroenterici acuti. | | | |
| Score specifici | | Dolore | Dolore | Dolore | Dolore |
| PROCEDURE DI TRIAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Attività | | Isolamento, accesso venoso. | | Isolamento | |
| Attivazione consulenza | | Superati i 60 minuti di attesa. Secondo protocollo locale. | | | |
| Terapia del dolore | | Secondo protocollo locale | | | |
| Rivalutazione | | Osservazione diretta o video- mediata con monitoraggio costante delle condizioni | Ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione su decisione del triagista, a richiesta del paziente, una volta trascorso il tempo di attesa massimo raccomandato | | |
| Altro | Vedere schede dei sintomi eventualmente associati. | | | | |

Manuale regionale Triage intra-ospedaliero modello Lazio a cinque codici

Decisione di Triage



Considerato il rash
cutaneo
orticarioide
pruriginoso e le
condizioni generali
buone, si assegna



4

CODICE NUMERICO/COLORE

Caso clinico 2

Valutazione Immediata

Condizioni generali discrete,
presenta zoppia

Valutazione soggettiva

Bambino di 11 anni con macchie
cutanee violacee sugli arti
inferiori associato a dolore da
circa 24 ore

Nega allergie

Nega patologie di base

Valutazione oggettiva

Parametri rilevati:

- FC 90 bpm
- FR 23 a/m
- SpO2 99%
- TC 36,4° C
- Dolore 7 secondo scala NRS

Esame obiettivo: rash di tipo
petecchiale agli arti inferiori,
edema del dorso del piede.

TRIAGE PEDIATRICO DELL'ERUZIONE CUTANEA

| CODICE TRIAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametri Vitali | da codice 1 | da codice 2 | da codice 3 | da codice 4 | da codice 5 |
| Caratteristiche del sintomo/segno principale | Rash petecchiale o purpurico con febbre alta e stato settico. Orticaria + altri sintomi compatibili con anafilassi. Edema della lingua e distress respiratorio | Orticaria in pz con pregressa reazione. Punture di imenotteri (vespe, api, calabroni) in pz con pregressa reazione. | Eruzione cutanea + febbre > 5 giorni. Reazione orticarioide ad insorgenza acuta dopo esposizione ad allergene, senza sintomi associati Rash purpurico agli arti inferiori. | Eruzione cutanea, sospetta malattia infettiva. Rash orticarioide pruriginoso. | Eruzione cutanea senza prurito. Punture d'insetto non associate ad altri sintomi. Lesioni dermatiti che senza altri sintomi. Riferita orticaria. |
| Sintomi/segni associati | Rigidità nucale | Distress respiratorio, sintomi gastroenterici acuti. | | | |
| Score specifici | | Dolore | Dolore | Dolore | Dolore |
| PROCEDURE DI TRIAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Attività | | Isolamento, accesso venoso. | | Isolamento | |
| Attivazione consulenza | | Superati i 60 minuti di attesa. Secondo protocollo locale. | | | |
| Terapia del dolore | | Secondo protocollo locale | | | |
| Rivalutazione | | Osservazione diretta o video- mediata con monitoraggio costante delle condizioni | Ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione su decisione del triagista, a richiesta del paziente, una volta trascorso il tempo di attesa massimo raccomandato | | |
| Altro | Vedere schede dei sintomi eventualmente associati. | | | | |

Manuale regionale Triage intra-ospedaliero modello Lazio a cinque codici



Decisione di Triage

Considerato il rush cutaneo di tipo petecchiale associato a dolore articolare, si assegna



3

CODICE NUMERICO/COLORE



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Caso Clinico 3

Valutazione Immediata

Condizioni generali buone

Valutazione soggettiva

Bambino di 7 anni con febbre, rinite e rash cutaneo pruriginoso, caratterizzato dalla presenza di vescicole, insorto da circa 2 giorni

Nega allergie

Nega patologie di base

SI INDIRIZZA IL
PAZIENTE VERSO UN
PERCORSO DEDICATO

Valutazione oggettiva

Parametri rilevati:

- FC 122 bpm
- FR 35 a/m
- SpO2 100%
- TC 38,6° C
- Dolore 4 secondo Scala NRS

Esame Obiettivo:

Presenza di rash cutaneo su testa e tronco caratterizzata da vescicole contenente liquido



TRIAGE PEDIATRICO DELL'ERUZIONE CUTANEA

| CODICE TRIAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametri Vitali | da codice 1 | da codice 2 | da codice 3 | da codice 4 | da codice 5 |
| Caratteristiche del sintomo/segno principale | Rash petecchiale o purpurico con febbre alta e stato settico. Orticaria + altri sintomi compatibili con anafilassi. Edema della lingua e distress respiratorio | Orticaria in pz con pregressa reazione. Punture di imenotteri (vespe, api, calabroni) in pz con pregressa reazione. | Eruzione cutanea + febbre > 5 giorni. Reazione orticarioide ad insorgenza acuta dopo esposizione ad allergene, senza sintomi associati Rash purpurico agli arti inferiori. | Eruzione cutanea, sospetta malattia infettiva. Rash orticarioide pruriginoso. | Eruzione cutanea senza prurito. Punture d'insetto non associate ad altri sintomi. Lesioni dermatiti che senza altri sintomi. Riferita orticaria. |
| Sintomi/segni associati | Rigidità nucale | Distress respiratorio, sintomi gastroenterici acuti. | | | |
| Score specifici | | Dolore | Dolore | Dolore | Dolore |
| PROCEDURE DI TRIAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Attività | | Isolamento, accesso venoso. | | Isolamento | |
| Attivazione consulenza | | Superati i 60 minuti di attesa. Secondo protocollo locale. | | | |
| Terapia del dolore | | Secondo protocollo locale | | | |
| Rivalutazione | | Osservazione diretta o video- mediata con monitoraggio costante delle condizioni | Ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione su decisione del triagista, a richiesta del paziente, una volta trascorso il tempo di attesa massimo raccomandato | | |
| Altro | Vedere schede dei sintomi eventualmente associati. | | | | |

Manuale regionale Triage intra-ospedaliero modello Lazio a cinque codici




Decisione di triage

Considerato il rash cutaneo caratterizzato da vescicole, nel sospetto di una malattia esantematica, si assegna...




4

CODICE NUMERICO/COLORE



Grazie!



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**