

	<b>Humira®</b> (adalimumab)	<b>Remicade®</b> (infliximab)
<b>Indicazioni</b>	§ Malattia di Crohn attiva grave adulti	§ Colite ulcerosa § Malattia di Crohn nei bambini § Malattia di Crohn negli adulti
<b>Profilo di sicurezza</b>	§ Tollerabilità simile ai MAB. § Rischio di TBC ed infezioni, simile ad Enbrel	§ Elevata incidenza di infezioni opportunistiche e riattivazione TBC § Neoplasie maligne e malattie linfoproliferative § Reazioni infusionali dovuti alla somministrazione e.v.
<b>M.o.A.</b>	§ Inibizione del TNF di membrana § Possibile induzione di anticorpi antifarmaco associati all'aumento della clearance ed alla riduzione dell'efficacia	§ Inibizione del TNF di membrana § Possibile induzione di anticorpi antifarmaco che riducono la risposta al farmaco
<b>Posologia</b>	§ La dose di Humira indicata in caso di terapia di induzione è pari a 80 mg alla settimana 0 per i pazienti adulti affetti da malattia di Crohn grave, seguita da una dose di 40 mg alla settimana 2. Nel caso in cui sia necessario indurre una risposta più rapida alla terapia, può essere somministrata una dose pari a 160 mg alla settimana 0 (tale dose può essere somministrata praticando quattro iniezioni nel corso di un giorno oppure due iniezioni al giorno per due giorni consecutivi), seguita da 80 mg alla settimana 2, tenendo presente che il rischio di eventi avversi risulta maggiore durante l'induzione. Dopo il trattamento di induzione, la dose indicata è pari a 40 mg a settimane alterne, somministrata per via sottocutanea. Alcuni casi possono giovare, in caso di insufficiente risposta documentata, di una dose di 40 mg/settimana	§ una prima infusione di 5mg/Kg seguita da infusioni supplementari con lo stesso dosaggio alla settimana 2 e 6 dalla prima infusione, ripetute poi da infusioni da 5mg/Kg/8 sett. per via e.v. <b>Il trattamento deve essere sospeso in mancanza di risposta dopo 12 settimane</b>
<b>costi per anno di terapia</b>	dosaggio e costi: 40 mg/2sett s.c. costo per paziente anno € 12206  dosaggio e costi: 1 dose 160 mg poi 1 dose 80 mg poi 40 mg/2sett s.c. costo per paziente anno €15345  dosaggio e costi: 40 mg/sett s.c. costo per paziente anno € 24412	dose 5mg/Kg 8 cicli e.v costo per paziente anno € 13.055